

FLÓRULA ARBÓREA DE VIÇOSA I. MELIACEAE (*Guarea* spp.)^{1/}

Antônio Lelis Pinheiro^{2/}
Roberto da Silva Ramalho^{2/}
Waldomiro Nunes Vidal^{3/}
Maria Rosária Rodrigues Vidal^{3/}

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é o primeiro de uma série de levantamentos dendrológicos realizados na microrregião de Viçosa pelo Setor de Dendrologia do Departamento de Engenharia Florestal da UFV.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O material que serviu de base para este estudo foi obtido de exemplares vivos, coletados pelos autores, e de amostras da coleção de exsicatas do Setor de Dendrologia e do Herbário VIC do Departamento de Biologia Vegetal da UFV.

Para a identificação taxonômica das espécies, o material botânico foi enviado ao Dr. Terence D. Pennington, do Kew Herbarium, na Inglaterra, e ao Dr. Humberto Barreiros, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As descrições das espécies foram baseadas nas de pesquisadores vários, como RAMALHO (13), RIZZINI (15) e VIDAL e VIDAL (18). O material descrito foi confrontado com as diagnoses de autores mencionados na literatura (4, 10, 14).

Nas medições foi empregado material recém-coletado.

3. FAMÍLIA MELIACEAE

Meliaceae A.L. de Jussieu, gen. Pl. ed. I 263. 1789; E.P. Ventenat, Tabl. Vig.

^{1/} Aceito para publicação em 30/10/1989.

^{2/} Departamento de Engenharia Florestal da UFV. 36570 Viçosa, MG.

^{3/} Departamento de Biologia Vegetal da UFV. 36570 Viçosa, MG.

encontra-se distribuída das Antilhas e Guianas até o Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. É encontrada, ainda, nos Estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

AMARAL (1) cita que o habitat natural dessa espécie é o interior de beira de mata, na floresta pluvial estacional do planalto centro-sul e em florestas de galeria.

Em Viçosa, MG, é comumente encontrada em sombreamento de pastagens e no interior das matas, sobretudo em margens de rio.

6.4.9. Nomes vulgares - marinheiro, jító, carrapeta, carrapateiro, jatuaúba, bilreiro, guaré, noqueira-do-mato, açafroa, canjerana-miúda, camboatá, camboatá. Na microrregião de Viçosa, MG, é conhecida por curamadre e piorra. Cedro-macho (Panamá); Guara, Yamao, Yamagua (Cuba); Bois Rouge (Haiti); Guaraguao (Porto Rico); Cabirme (República Dominicana); Redwood (Trindade); Trompillo (Bolívia); jatuaúba (Brasil, Amazonas); rosa-branca (Brasil, Bahia); jító (Brasil, Ceará); marinheiro (Brasil, Goiás); curamadre (Brasil, Minas Gerais); jatuaúba-igapó (Brasil, Pará); carrapeta-da-mata-virgem (Brasil, Rio de Janeiro) camboatá (Brasil, São Paulo), Bilibil, San Matias, Zambo cedro, Cedro trompillo, Cedro-macho, Guamo simarron (Colômbia); fruta-de-loro, tocota, Come pavo (Equador); Karababalli, Bastard Crabwood, Buke puke, Buck vomit (Guyana); Cuquinho, Yantsau, Yancau, Requia, Requia colorada, Urcurequia (Amazônia Peruana); Karababalli Wedokora Abo, Doifisirie (Suriname); Trompillo, Cabimbo, Peonia (Venezuela).

Material examinado - Minas Gerais: Pedra do Anta; leg. RAMALHO e LELIS 2864 (10.XI.1983). Exsi. 1847 DEND. Viçosa, UFV, leg. RAMALHO e LELIS 2875 (01.XII.1983), Exsi. 1852 DEND.

7. RESUMO

Este trabalho consta de descrições dendrológicas de Meliaceae, família, gênero e espécies, acompanhadas de ilustrações. São fornecidas chaves para a identificação das espécies coletadas na microrregião de Viçosa, MG.

8. SUMMARY

(FLORA OF VIÇOSA. I. MELIACEAE (*Guarea* spp.))

The authors describe the Meliaceae, the genus *Guarea* and its species, collected in the Viçosa region, State of Minas Gerais, Brazil. A key to these species is presented.

9. LITERATURA CITADA

1. AMARAL, L.G. Meliaceae. Flora do Estado de Goiás. *Coleção Rizzo*, 2(37):1-56, 1981.
2. BARROSO, G M. *Sistemática de angiospermas do Brasil*. Viçosa, MG, Imprensa Universitária, UFV, 1984. Vol. 2. 237 p.
3. BUCHINGER, M. & FALCONE, R. Nota sobre algumas meliáceas argentinas. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 5:203-208, 1955.
4. De CANDOLLE, C Meliaceae. In: MARTIUS, C.F.B., (ed.), *Flora Brasiliensis*. Monachii, Lipsiae, 1878. p. 166-227.