

OS TIPOS DAS PLANTAS VASCULARES DO HERBÁRIO DA
UNIVERSIDADE RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (VIC).

II - Asclepiadaceae, Ebenaceae, Solanaceae

Maria Rosária R. Vidal
Waldomiro Nunes Vidal *

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um prosseguimento da primeira contribuição, que consta dos "tipos" das seguintes famílias: Anonaceae, Commelinaceae, Compositae, Moraceae e Xyridaceae (1).

ASCLEPIADACEAE

Oxypetalum Mexiae Malme in Ark. f. bot. 28 A V (1936)
.6, fig. 3: Typus - Minas Gerais: Viçosa, Fazenda da Aguada,
700 m S. m. 6/10/1930 (Ynes Mexia nº 5174).

ISOTYPUS

Sched.: ... Oxypetalum Schenckii K. Schum? Buraco

* Respectivamente, Professora Assistente e Professor Adjunto da Escola Superior de Agricultura da UREMG.

Recebido para publicação em 29-4-1969.

Os autores agradecem ao falecido Prof. Alberto Castellanos, pela orientação e revisão, quando em vida, das categorias de "Typus" constantes neste trabalho.

Frio; slope of valley in cut-over woods. Vine, climbing 6m, thick, milky juice; greenish flower. Frequent. Ynes Mexia, Oct. 6, 1930, nº 5147.

Obs. Há discordância entre a etiqueta de herbário e a obra original, apenas no número de coleta.

EBENACEAE

Diospyros Mexiae Standley in Field Mus. Nat. Bot. 22 II (1940) 97: Brazil: about Fazenda da Gramma, Districto Carangola, State of Minas Gerais, February 4, 1930, Ynes Mexia 4316 (Type in Herb. Field Mus.).

ISOTYPUS

Sched.: ... Ynes Mexia 1930, nº 4316.



FIG. 1 - Diospyros Mexiae Standley.

SOLANACEAE

Capsicum praetermissum Heiser & Smith in Brittonia 10 IV (1958): Type: Ynes Mexia 4205, Jan. 3, 1930. Brazil; Mi-

nas Gerais: Viçosa. Road to São Miguel. alt. 700 m (F, dupl. at NY, MO, UC, US).

Other specimens examined. Minas Gerais: Viçosa. Agricultural College Lands, Ynes Mexia 4493 (F, NY, MO, UC, US). Santa Catarina: Brusque, seed collected by Padre R. Reitz and grown at Indiana University, Heiser C74 (Ind.). São Paulo: Piracicaba, grown at Indiana, Smith Ac. 1231; São Carlos, grown at Indiana, Smith Ac. 1229; Campinas seed collected by O. de Toledo Prado and grown at Indiana, Smith Ac. 1870 (Ind.).

Common names: comari, cumari, pimentinha, pimentã.

ISOTYPUS

1.^a Sched.: leg. Ynes Mexia 1930, nº 4205.




FIG. 2 - Capsicum praetermissum Heiser & Smith.

DUPLA DO PARATYPUS

2.^a Sched.: ... leg. Ynes Mexia 1930, nº 4493.



FIG. 3 - Capsicum praetermissum Heiser & Smith.

RESUMO

A presente contribuição consta de uma seleção de "Tipos" das famílias Asclepiadaceae, Ebenaceae e Solanaceae, do herbário de Viçosa (VIC).

Foram feitas as transcrições das descrições originais, procurando-se, dêste modo, estabelecer as categorias dos tipos existentes no herbário.

SUMMARY

This paper consists of a selection of types of the Asclepiadaceae, Ebenaceae e Solanaceae families, from the Viçosa herbarium (VIC).

Transcriptions of the original descriptions were made, thereby attempting to establish the categories of the types ex-

isting in the herbarium.

LITERATURA CITADA

1. VIDAL, M.R.R. & VIDAL, W.N. Os tipos das plantas vasculares do herbário da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Rev. Ceres, Viçosa 15(84): 71-80. 1968.