

OS TIPOS DAS PLANTAS VASCULARES DO HERBÁRIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (VIC)

III - Piperaceae *

Maria Rosária Rodrigues Vidal
Waldomiro Nunes Vidal**

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é continuação de duas contribuições anteriores. A primeira tratou dos tipos das famílias Anonaceae, Commelinaceae, Moraceae e Xyridaceae (1); a segunda abrangeu os tipos das famílias Asclepiadaceae, Ebenaceae e Solanaceae (2).

Uma ressalva deve ser feita. Os tipos coletados por Ynes Mexia são aqui relacionados como espécies novas de Yuncker, conforme a literatura citada; entretanto, tal coleção do herbário de Viçosa recebeu, na etiqueta original, nomenclatura diferente da de Yuncker, por intermédio de Trelease, que também classificou os exemplares como espécies novas, porém com outros nomes científicos.

Os autores, não encontrando nenhuma referência bibliográfica acerca destas espécies de Trelease, resolveram divulgar os referidos tipos de acordo com Yuncker, uma vez que não é dos objetivos deste trabalho essa discussão nomenclatural.

* Aceito para publicação em 12-01-1972.

**Respectivamente, Professora Assistente e Professor Adjunto da Universidade Federal de Viçosa.

Existe, ainda, no herbário VIC, uma coleção de tipos de Piperaceae, determinada por Trelease, que deverá ser conhecida num próximo trabalho, logo que forem encontradas as referências bibliográficas.

PIPERACEAE

Peperomia riparia Yuncker in Bol. Inst. Bot. Secr. Agric. Est. S. Paulo III (1966) 169, fig. 150: "Minas Gerais: Dist. Ilhéus, Faz. da Tabunha, Cachoeira do Munhin, on shady stream bank, alt. 200 m, 27 Aug. 1930 MEXIA 5008 (BM, type; ILL; NY; S)".

ISOTYPUS

Sched.: leg. Ynes Mexia nº 5008, determinado por Trelease sub Peperomia munhimensis Trelease ap. Nov.




FIGURA 1 - Peperomia riparia Yuncker.

P. rufispica Yuncker, l. c. 172, fig. 153: "Minas Gerais: Viçosa, road to São Miguel, slope near km 5, edge of dense woods, alt. 700 m, 21 Oct. 1930, MEXIA 5200 (ILL, type; US)".

ISOTYPUS

Sched. : leg. Ynes Mexia nº 5008, determinado por Trelease sub Peperomia sanguineispica Trellease sp. nov.




FIGURA 2 - Peperomia rufispica Yuncker

Piper pauciramosum Yuncker, l. c. 60, fig. 50: "Minas Gerais: District Ilhéus, Faz. da Tabunha, alt. 300 m., 13 Aug. 1930, MEXIA 4973 (BM; GH; ILL; NY; type; S; US; Z); Ouro Fino, 10 May 1927, HOEHNE s. n. (ILL)".

ISOTYPUS

Sched.: Plants of Brazil. State of Minas Gerais, leg. Ynes Mexia 18 VIII 1930, nº 4973, determinado por Trelease sub Piper tabunhanum Trelease sp. nov. Co-type. Erect and few-branched, perennial herb, 6 m. high; brownish fruit. Abundant locally.




FIGURA 3 - Piper pauciramosum Yuncker

P. ottonoides Yuncker, l. c. 109, fig. 95: "Pará: Remansão do Centro, E. Ferro Tocantins, 1 Oct. 1948, FRÓES 23592 (IAN, type); same loc., 10 May 1948, PIRES 1194 (IAN; US); Belém, near Catu, 15 Sept. 1942, SILVA 70 (IAN; US). Minas Gerais: Viçosa, Faz. de José Alexandre, alt. 725 m, 20 Nov. 1932, MEXIA 5332 (G; GH; ILL; MO; NY; S; US; Z). The leaves on this collection are more ovate-lanceolate and somewhat

smaller than on those from Pará but otherwise it agrees well".

ISOPARATYPUS

Sched. Plants of Brazil. State of Minas Gerais, leg. Ynes Mexia 20 XI 1930, nº 5332, determinado por Trelease sub Piper laetum C. DC. var. flagellispicum Trelease var. nov. Co-type. Erect, perennial herb, with erect, whitish spike.




FIGURA 4 - Piper ottonoides Yuncker

P. pubisubmarginalum Yuncker var. ubanum Yuncker, l. c. 115, fig. 101: "Minas Gerais: 4 km s. of Viçosa, on road to Ubá, Mun. Viçosa, much.—branched shrub, 1.5 m high, in shade of secondary forest, red clay soil; inflorescences green; occasional, 26 Nov. 1958, IRWIN 2162 (F; US, type, as sheet 2281276)".

ISOTYPUS

Sched. : . . . leg. H. S. Irwin 26 XI 1958, nº 2162.




FIGURA 5 - Piper pubisubmarginalum Yuncker. var. ubanum Yuncker.

P. viçosanum Yuncker, l. c. 74, fig. 64: "Minas Gerais: Viçosa, Fazenda do Deserto; Varje, alt. 690 m. 3 Nov. 1930, Mexia 5242 (BM; GH; ILL; NY; S; US; type, as sheet 1618044; Z); Viçosa, Faz. de Beserva, alt. 940 m, 10 Dec. 1930, MEXIA 5401-a (BM; ILL); Dist. Casca, Faz. de Côco-de-Ouro, alt. 210 m, 28 Aug. 1930, MEXIA 5015 (F; GH; MO; Z)".

ISOTYPUS

1ª Sched. : . . . Plants of Brazil. State of Minas Geraes,

leg. Ynes Mexia 3 XI 1930, nº 5242, determinado por Trelease sub Piper dezertense Trelease sp. nov. Co-type. Perennial herb 2,5 m. high; large, deciduos stipules. Two plants found. "João Borandý".




FIGURA 6a - Piper viçosanum Yuncker.

ISOPARATYPUS

2ª Sched. leg. Ynes Mexia 5401-a, determinado por Trelease sub Piper beservanum Trelease sp. nov.

ISOPARATYPUS

3ª Sched. Plants of Brazil, State of Minas Geraes, leg. Ynes Mexia 28 VIII 1930, nº 5015, determinado por Trelease sub. Piper amplum Kunth. Perennial herb 2 m. high. "João Borandý".




FIGURA 6b - Piper viçosanum Yuncker.




FIGURA 6c - Piper viçosanum Yuncker.

2. RESUMO

A presente contribuição consta de uma seleção de "Tipos" da família Piperaceae, do herbário de Viçosa (VIC).

Foram feitas as transcrições das descrições originais, procurando-se, deste modo, estabelecer as categorias dos tipos existentes no herbário.

3. SUMMARY

This paper consists of a selection of types of the Piperaceae, from the Viçosa herbarium (VIC).

Transcriptions of the original descriptions were made, thereby attempting to establish the categories of the types existing in the herbarium.

4. LITERATURA CITADA

1. VIDAL, M.R.R. & VIDAL, W.N. Os tipos das plantas vasculares do herbário da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Rev. Ceres, Viçosa 15(84):71-80. 1968.
2. VIDAL, M.R.R. & VIDAL, W.N. Os tipos das plantas vasculares do herbário da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. II. Rev. Ceres, Viçosa 16(88):102-106. 1969.