

OCORRÊNCIA DE *Spizaetus ornatus ornatus* DAUDIN, 1801, GAVIÃO-DE-PENACHO (FALCONIFORMES: ACCIPITRIDAE) EM VIÇOSA, MINAS GERAIS^{1/}

Alberto Resende Monteiro^{2/}
Geraldo Theodoro de Mattos^{3/}

Viçosa (MG)20°45'S e 42°07'W, com altitudes variando entre 650 a 700 metros, encontra-se localizada na região mineira denominada: Zona da Mata de Minas Gerais. Os focos de mata que ainda podem ser encontrados no município são bastante variados englobando restos de mata virgem, mata secundária, matas ciliares e de encosta, florestas de *Pinus* e *Eucaliptus*. Tais coberturas vegetais também cobrem partes da Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde vive uma fauna alada, bastante interessante sob o aspecto de número de espécies.

MOOJEN (5) em seu trabalho pioneiro sobre as aves de Minas Gerais, cita várias espécies que ocorreram e ainda ocorrem em Viçosa, fornecendo desde 1943 provas inegáveis sobre a importância do município mineiro no cenário ornitológico brasileiro.

MITCHELL (3) durante sua permanência no Brasil, observou a avifauna do sul deste brasileiro, registrando mais de 15 espécies de aves para Minas Gerais, sendo que 13 dessas ocorrem em Viçosa (MG).

ERICKSON e MUMFORD (2), trinta e três anos após o trabalho de Moojen, observaram e registraram 206 espécies para a Zona da Mata, onde se inclui evidentemente Viçosa, demonstrando que a ornitofauna da região é muito variada e «sui generis».

Os trabalhos desses pesquisadores somam-se no sentido de proporcionar aos estudiosos do assunto uma fonte inesgotável de informações.

A zoofonia foi o principal método utilizado na identificação dessa espécie. O conhecimento das vocalizações das espécies aladas possibilita o registro seguro,

^{1/} Recebido para publicação em 21-09-1983.

^{2/} Colégio Universitário da UFV — 36570 — Viçosa — MG.

^{3/} Ministério da Agricultura — 30000 — Belo Horizonte — MG.

principalmente se a espécie se encontra em locais de difícil acesso, o que impossibilita sua visualização (11).

Foram empregados nas identificações, binóculos ASAHI-PENTAX e ZEISS tipo 8x30, além do conhecimento dos planos de vôo e tipos de ninhos da ornis (7, 11).

Durante os trabalhos de levantamento da ornitofauna da região de Viçosa (MG) (4), foi observado pela primeira vez em 10-10-83, no «Campus» da Universidade Federal de Viçosa, *Spizaetus ornatus ornatus*, o gavião-de-penacho jamais registrado nessa área por outro autor (2, 3, 5). A presença desse avantajado accipitrídeo provoca uma série de controvérsias com relação aos seus hábitos de comportamento, no que tange à migração. Estaria a espécie em processo de colonização na região de Viçosa ou simplesmente utilizando a área onde foi observado para descanso e alimentação?

A presença do gavião-de-penacho foi percebida pelos dois fortes piados que a ave emitiu, semelhantes ao fraseado: gá-á-á-á. Em seguida, o grande rapineiro foi avistado plainando calmamente sobre a mata próxima do Setor de Dendrologia da UFV. Nesse instante vocalizou novamente, entretanto de maneira bem diferente da anterior: piou rapidamente, có-có-có-có, bem forte e afastou-se silenciosamente, permitindo que sua silhueta inconfundível fosse observada.

SUMMARY

(ORNITHOLOGICAL NOTES. I. THE OCCURRENCE OF THE PLUMED HAWK. *Spizaetus o. ornatus* Daudin, 1801, (Falciformes: Accipitridae), AT VIÇOSA, MINAS GERAIS, BRAZIL.)

The plumed hawk, *Spizaetus o. ornatus* Daudin, is recorded for the first time from Viçosa, Minas Gerais. This record is very important in ornithological studies because this species is rare in Brazil. Furthermore, there is no literature concerned with the biological and distributional attributes of this species in Brazil.

LITERATURA CITADA

1. BLAKE, E.R. *Manual of neotropical birds*. Chicago, The University of Chicago, 1977. 674p.
2. ERICKSON, H. & MUMFORD, R.E. *Notes on birds of the Viçosa, Brazil Region*. West Lafayette, Purdue University, 1976. 29p. (Station Bulletin n.º 131).
3. MITCHELL, M.H. *Observations on birds of southeastern Brazil*. Toronto, Toronto University, 1956. 258p.
4. MONTEIRO, A.R.; MATTOS, G.T. & PONTES, J.L. Avifauna observada e identificada no município de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. *Experientiae* 29(3): 31-47, 1983.
5. MOOJEN, J. Fauna de Minas Gerais: Aves. *Revista Ceres* 5(26):115-120, 1943.
6. OLROG, C.C. *Las aves sudamericanas-Una guia de campo*. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1968. 507p.

7. PETTINGILL, O.S. *A laboratory and field manual of ornithology*. 3 ed. Minneapolis, Burgess Publishing, 1956. 379p.
8. RUSCHI, A. *Aves do Brasil*. São Paulo, Rios, 1979. 335p.
9. SCHAUENSEE, R.M. de. *A guide to the birds of South America*. Livingston, Burgess Publishing, 1970. 470p.
10. SICK, H. A voz como caráter taxonômico em aves. *Boletim do Museu Nacional — Nova Série* 294: 1-11, 1979.
11. SICK, H. & TEIXEIRA, D.M. *Notas sobre aves brasileiras raras ou ameaçadas de extinção*. Rio de Janeiro, Museu Nacional, 1979. 39p. (Publicações avulsas do Museu Nacional n.º 62).